


ការវិវត្តន៍របស់ពងជ័រ កើតសើអណ្តាត



ស្នាមស្នាមទើបចាប់មាននៅលើជើង



២-៣ ថ្ងៃក្រោយមកទៀត



ស្លាកស្នាមនៅលើដោះ



ស្លាកស្នាមនៅលើដៃរបស់មនុស្សដែល
ឆ្លងជំងឺអុតគ្លាម



ជំងឺអុតគ្លាម (FMD)

➤ ការការពារ :

- ✓ ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពលើជ្រូកទេ ប៉ុន្តែ វ៉ាក់សាំង ដែលគេធ្លាប់ប្រើគឺ ប្រភេទអូ (Type O) ដោយចាក់ វ៉ាក់សាំង ២ ដង/ឆ្នាំ ហើយធ្វើការចាក់ឡើងវិញ ប្រសិនបើនៅភូមិ ជិតនោះ មានផ្ទះជំងឺនេះ។
- ✓ ជីវសុវត្ថិភាព : មិនងាយស្រួលទេ ព្រោះវាមានការរាតត្បាតខ្លាំង ប៉ុន្តែ ត្រូវតែរឹតបន្តឹងលើការចូល ទស្សនកិច្ច ហើយអ្នកចូលទស្សនកិច្ច ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរសំលៀក បំពាក់ចេញ។

ជំងឺអុតក្លាប (FMD)

➤ ការការពារ :

- ✓ ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពលើជ្រូកទេ ប៉ុន្តែ វ៉ាក់សាំង ដែលគេធ្លាប់ប្រើគឺ ប្រភេទអូ (Type O) ដោយចាក់ វ៉ាក់សាំង ២ ដង/ឆ្នាំ ហើយធ្វើការចាក់ឡើងវិញ ប្រសិនបើនៅភូមិ ជិតនោះ មានជំងឺនេះ។
- ✓ ជីវសុវត្ថិភាព : មិនងាយស្រួលទេ ព្រោះវាមានការរាតត្បាតខ្លាំង ប៉ុន្តែ ត្រូវតែរឹតបន្តឹងលើការចូល ទស្សនកិច្ច ហើយអ្នកចូលទស្សនកិច្ច ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរសំលៀក បំពាក់ចេញ។

ជំងឺសារធិកជ្រូក

➤ បុព្វហេតុបង្កជំងឺ:

- ✓ ជាជំងឺឆ្លង ដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរី។ មេរោគឈ្មោះ ប៉ាស្ទ័រេលឡាមីលតូស៊ីដា។
- ✓ ជំងឺនេះច្រើនកើតនៅលើជ្រូក គ្រប់ប្រភេទ ប៉ុន្តែកើតច្រើនបំផុតគឺ នៅលើជ្រូកអាយុ ចាប់ពី ២-៦ ខែ។
- ✓ ជំងឺនេះច្រើនកើតនៅដើម និងចុងរដូវ ភ្លៀង។

✓ មេរោគឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់រវាងជ្រូកឈឺ និងជ្រូកជា
ឬឆ្លងដោយប្រយោល តាមរយៈមនុស្ស និង សត្វដ៏ទៃ
ទៀតដែលមានជំងឺនេះ។

✓ ក្រៅពីនេះ ជំងឺក៏អាចឆ្លងពីធម្មជាតិបានដែរ
ព្រោះមេរោគនៃជំងឺនេះរស់នៅក្នុងដី និងនៅ លើខ្នងសត្វ
ពេលណាសុខភាពសត្វចុះខ្សោយ ឬពេលណា
មេរោគនៃជំងឺនេះជួបលក្ខណៈ អំណោយផល
វារីកដុះដាលយ៉ាកឆាប់រហ័ស បង្កឱ្យមានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

ជំងឺសារធិកជ្រូក

➤ រោគសញ្ញា៖ ចែកជាបីកំរិត

✓ កំរិតធ្ងន់៖ ក្តៅខ្លាំង មិនស៊ីចំណី ងាប់រហ័ស
ជួនកាលម្ចាស់អ្នកចិញ្ចឹម មិនទាំងដឹងថាជ្រូកឈឺផង
ពេលខ្លះ គេឃើញជ្រូកដែលងាប់ដោយសារ ជំងឺនេះ
មានហូរឈាមតាមច្រមុះ។

✓ **កិច្ចបញ្ជូន:** រោគសញ្ញាច្បាស់បំផុតនោះគឺ

រលាកសួត ហើមបំពង់ក ពិបាក ដកដង្ហើម ហេតុហត់
ផ្គត់ពោះ ហៀរសំបោរខាង ក្តៅពី ៨១-៨២ អង្សាសេ
រួចហើយឃើញមានចំណុច ក្រហម ជួនកាលចំណុច
ក្រហមនេះផ្គុំគ្នាជាផ្ទាំងកន្លែង ស្បែកស្លើង ហើយ ៥-
៦ ថ្ងៃ ក្រោយមកជ្រូកនិងងាប់។

ជំងឺសារធិកប្រូក

➤ **រោគសញ្ញា:** ចែកជាបីកំរិត

✓ **កំរិតស្រាល:** ក្តៅ ៣៩-៤០ អង្សាសេ មិនសូវ
ស៊ីចំណី រលាកសួត ហៀរសំបោរ ទល់លាមក
ស្បែករមកទាំងផ្ទាំងៗ។ បើមិនថែទាំព្យាបាលឱ្យវាទេ ៨-៩
អាទិត្យក្រោយជ្រូកអាចងាប់ដោយសារហេតុហត់ អស់
កំលាំង។

ជំងឺសារធិកជ្រូក

➤ រោគវិនិច្ឆ័យ:

- ✓ ក្នុងកំរិតធ្ងន់: គ្រប់ភ្នាសស្បែងមានចេញឈាម រលាកស្មុត និងមានស្មៅនៅក្នុងបំពង់ក។
- ✓ កំរិតមធ្យម: ស្មុតរលាក ហើមពណ៌ស្វាយ រីង ជួនកាលមានដក់ទឹកបេះដូងចេញឈាម ក្រពេញ ទង់ស្មុតហើម ចេញឈាម។
- ✓ កំរិតស្រាល: ស្មុតរលាកយ៉ាងខ្លាំង ជួនកាលមានខ្វះ។ នៅគ្រប់កំរិតសុទ្ធតែមានហូរឈាមតាមស្បែក។

36

ជំងឺសារធិកជ្រូក

➤ ការព្យាបាល:

- ✓ ត្រូវព្យាបាលជាបន្ទាន់ ព្រោះជំងឺនេះបណ្តាលឱ្យជ្រូកងាប់ រហ័សណាស់ យើងអាចប្រើ ថ្នាំណាមួយក្នុង ចំណោមថ្នាំដូចខាងក្រោម:
 - ស្រែបតូមីស៊ី ៣-៤ ថ្ងៃ
 - ប៉េនីស៊ីលីន ៣-៤ ថ្ងៃ
 - តេត្រាមីស៊ីន ៣-៤ ថ្ងៃ
 - ស៊ីលហ្វា ៣-៤ ថ្ងៃ

ជំងឺសារទឹកជ្រូក

➤ វិធីការពារ:

- ✓ ត្រូវធ្វើអនាម័យ សំអាតទ្រូងជាប្រចាំ។
- ✓ ឱ្យជ្រូកស៊ីចំណីមានជីវជាតិត្រប់គ្រាន់
- ✓ ខែភ្លៀងកុំលេងជ្រូកឱ្យចេញក្រៅទ្រូង
- ✓ ត្រូវលាងបន្លែឱ្យស្អាតមុនឱ្យជ្រូកស៊ី។
- ✓ បំបែកជ្រូកឈឺចេញពីជ្រូកជា
- ✓ ចាក់ថ្នាំការពារជំងឺសារទឹក ចាក់សើរស្បែក។

ជំងឺសាល់ម៉ូណូឡូស

➤ បុព្វហេតុបង្កជំងឺ

ជំងឺនេះកើតលើជ្រូកគ្រប់ប្រភេទ ពិសេសលើកូនជ្រូក។

ជំងឺនេះបង្កឡើងដោយវីរុសបានធ្វើអោយរលាកពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរ។

ជម្ងឺសារល់ម៉ូណេឡូស

➤ រោគសញ្ញា

- មិនស៊ីចំណី ក្អក និង រាត្រូវសយ៉ាងខ្លាំង
- រាត្រូវជាប្រចាំ ស្រកទំងន់ ឆ្អឹងទឹកច្រើន
- លាមកពណ៌ស ជួនកាលបែតងស្លឹកឈើ
- កូនជ្រូកឈឺនៅតែក្សេក្សាយទឹក ហើយអាចស្លាប់ក្នុងរយៈពេល១អាទិត្យ

បន្ទាប់មករោគសញ្ញាជាលើកដំបូង។ ករណីខ្លះកូនជ្រូកអាចស្លាប់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់៤៨ម៉ោង។ អត្រាងាប់អាចមានដល់១០០%ចំពោះកូនជ្រូកអាយុក្រោម១អាទិត្យ។

40

ជម្ងឺសារល់ម៉ូណេឡូស

➤ **ស្ថានភាពស្ថានភាព:** កូនជ្រូកឈឺយូរថ្ងៃ ក្នុងក្រពះទទេស្អាត ចំណែកកូនជ្រូកឈឺភ្លាមងាប់ភ្លាមក្នុងក្រពះពេញដោយទឹកដោះ។ ប្រដាប់រំលាយអាហារមានស្នាមដំបៅ។

➤ **រោគវិនិច្ឆ័យ:** សំគាល់បានដោយសារ

- ឆ្អឹងរាលដាលលើជួរ
- អត្រាងាប់ខ្ពស់

ជម្ងឺសាច់ប៉ូណេឡូស

➤ ការព្យាបាល

-មិនទាន់មានថ្នាំណាអាចព្យាបាលបានគប់ប្រសើរទេ ប៉ុន្តែថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិក មួយចំនួនដូចជា៖ អូរីអូមីស៊ីន និង តេរ៉ាមីស៊ីន ដែលប្រើព្យាបាលកូនជ្រូក ដើម្បីពន្យាថ្លៃងាប់ប៉ូណេឡូស ។

-ហ្គាតិដេន ស៊ុលហ្វាមីឃាស៊ីល ស៊ុលហ្វាមេរ៉ាស៊ីន រយៈពេល៣-៥ថ្ងៃ

-ចាក់សេរ៉ូម ផ្តុំម រឺ សេរ៉ូមប្រៃ អោយស៊ីចំណីសំបូរជីវជាតិ រឺ

អោយជីក ប៉ូលីវីតាមីន ។


➤ ការការពារ៖ ត្រូវចាក់ថ្នាំការពារតាមការណែនាំរបស់បសុពេទ្យ ។

42

ជម្ងឺបរិស្ថិត

១-បរិស្ថិតខាងក្នុង៖ ព្រូនមូល និងព្រូនសំប៉ែត ។ រស់នៅខាងក្នុង សារពាង្គកាយរបស់ជ្រូកដូចជា ភ្នែក ពោះវៀន និង ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ។

43



ជម្ងឺបរិស្ថិត

២-បរិស្ថិតខាងក្រៅ: ចំបង អង្កែ កមរមាស ដែលរស់ នៅក្រៅ
សារពាង្គកាយជ្រូក (នៅក្នុងរោម ស្បែក) ។