



ជម្ងឺបរិស្ថិត

➤ ការចំលង


- ព្រួនមូល និងសំប៉ែតករកើត និងបំពេញវដ្តជីវិតនៅក្នុងសារពាង្គកាយជ្រូក
- ពងព្រួនធ្លាក់ចេញតាម លាមកជ្រូកទៅមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ និងញាស់ជាកូនព្រួន ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសមស្រប (កំដៅ និង សំនើម) នៅពេល ជ្រូកស៊ីចំណីដែលមាន កូនព្រួន វានឹងលូតលាស់កើតជាព្រួន ពេញវ័យ និង ធ្វើការបង្កពូជតាមវដ្តជីវិត របស់វា។
- ការប្រលាក់ប្រលូកជាមួយវត្ថុផ្សេងៗ នឹងតាមទឹកជាដើម ពងល្អិតៗ របស់ព្រួន អាចរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅបានរាប់ខែ។

ជម្ងឺបរាស៊ីត

ការពារជំងឺ

- ពងព្រូន មូល ឬសំប៉ែត ដែលចេញមកក្រៅតមរយៈលាមកសត្វ គឺឯអាចសាយភាយទៅត្រប់ទីកន្លែង។
- ការចំលងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានតាមរយៈភាពរាយប៉ាយរបស់លាមក ដោយចលនាសត្វ។

វដ្តជីវិត របស់បរាសិតខាងក្នុង



ជម្ងឺបរ៉ាស៊ីត

➤ រោគសញ្ញា

- ជ្រួតក្រធំ ចុះស្កម ខ្សោយ ស្បែកលឿង ជួនបណ្តាលអោយក្អក ដោយសាររលាកសួត។

- ករណីព្រួនមានពី ១០០-២០០ក្បាល នោះធ្វើអោយ រាគុស ពេលខ្លះ ចុកពោះ រីកតចេញព្រួនពេលមានព្រួនច្រើនក្នុងពោះទៀត។ ស្ទុះបំពង់ទឹកប្រមាត់ ពេលព្រួនចូលទៅក្នុងថ្លើម និង កន្ត្រាក់ខ្លួន ដោយសារព្រួនបញ្ចេញជាតិពុលប៉ះ ពាល់ដល់សសៃប្រសាទ។

- កូនជ្រួតអាចងាប់យ៉ាងច្រើនប្រសិន បើព្យាបាលមិនទាន់ពេលជ្រួតកំពុង

ជម្ងឺបរ៉ាស៊ីត

➤ ការព្យាបាល: ថ្នាំទំលាក់ព្រួនដែលគេនិយមប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺ អ៊ីវ៉ូមីថ។ ក្រៅពីនេះមានថ្នាំ២ប្រភេទទៀតគឺ:

- តេត្រាមីស្ទីល: ចាក់សើស្បែក ១០មក្រ/ទំងន់១គក្រ (ទំងន់ក្រោម ២០គក្រ)។ ៥-៧មក្រ/ទំងន់១គក្រ (ទំងន់លើស ២០គក្រ)។

- ឡីវ៉ាវីស្ទីល: (ឈ្មោះផ្សេងទៀត ដូចជា នេមីសូល អង់ធឺលស្ទីល ប៊ុគីស្ទីល ឌីការីស និង វិណាករ) ចាក់សើស្បែក ៧.៥មក្រ/ទំងន់១គក្រ (ទំងន់ក្រោម ២០គក្រ)។ ៥មក្រ/ទំងន់១គក្រ (ទំងន់ ២០-៥០គក្រ)។ ២មក្រ/ទំងន់១គក្រ (ទំងន់លើស៥០គក្រ)។

■ ប្រយ័ត្ន: គួរពិនិត្យកំរិតប្រើលើសំបកថ្នាំអោយបានច្បាស់មុនចាក់លើជ្រួត ។

ជម្ងឺបញ្ឆាស្រួត

➤ វិធានការណ៍ការពារ


- ត្រូវទំលាក់ព្រួនអោយមេជ្រួនមុនពេលកើតកូន ដើម្បីកុំអោយកូនជ្រូក ឆ្លងព្រួនពីមេ។
- ទ្រុឌត្រូវ ស្អាត ស្អុត មានពន្លឺថ្លៃចេញចូលគ្រប់គ្រាន់
- មិនត្រូវចិញ្ចឹមកូនជ្រូកជាមួយជ្រូកធំទេ
- ត្រូវទំលាក់ព្រួនអោយកូនជ្រូកក្រោយពេលផ្តាច់ដោះ មួយខែម្តង រហូតដល់៤ខែ
- មិនត្រូវអោយជ្រូកត្បូលគំនរលាមកទេ
- លាបទឹកកំប្តៅ រឺ បាញ់ថ្នាំសំលាប់មេរោគលើជញ្ជាំងទ្រុឌ និង ជុំវិញទ្រុឌអោយបានទៀងទាត់តាមការណែនាំបសុពេទ្យ។
- ត្រូវមានកន្លែងផ្តាច់លាមក ហើយត្រូវរោយកំប្តៅសំលាប់ពងព្រួន។

កម្មវិធីវ៉ាក់សាំងជ្រូក

ប្រភេទថវិកាសំបាប់	ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម	អាយុ(ខែ)	គិតប្រើ(CC)
ជាតិដែក (Iron)- មិនមែនវ៉ាក់សាំង	-	3	2
ក្បាល (Castration)- មិនមែនវ៉ាក់សាំង	-	10	-
គ្រុនពោះវៀន (Salmonellosis #1)	Pho Thuon Han (VN)	21	2
សារឺក (Pasteurellosis #1)	Tu Huyet Trung (VN)	28	2
អាសន្នរោគ (Pest porcine #1)	Dich Ta Heo (VN)	35	2
ចំណាក់ព្រូន (De-worm)- មិនមែនវ៉ាក់សាំង	Ivermic (Thai)	42	តាមចំណុំ
គ្រុនពោះវៀន (Salmonellosis #2)	Pho Thuon Han (VN)	51	2
សារឺក (Pasteurellosis #2)	Tu Huyet Trung (VN)	58	2
អាសន្នរោគ (Pest porcine #2)	Dich Ta Heo (VN)	65	2
អុតក្តាម (Foot and Mouth Disease-FMD)	Aftopor (France)	72	2 54


ការចាក់ថវិកាសំបាប់វិចារក្តី

១. ទីតាំងចាក់សាច់ដុំ



ការចាក់វ៉ាក់សាំងវីចាក់ថ្នាំ

២. ទីតាំងចាក់សើរស្បែក



ការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់

- អនុវត្តចាក់បង្ហាញលើជ្រូកសិប្បនិម្មិត
- អនុវត្តចាក់បង្ហាញលើជ្រូកពិតនៅកសិដ្ឋាន

SWINE MINERALS



PREMIX ខនីមីនកម្រិត

1Kg

• មាតិកាសមាស :

Folic Acid	200mg
Biotin	20.000mg
Manganese	5.000mg
Iron	10.000mg
Copper	40.000mg
ZinC	100.000mg
Iodine	900mg
Cobalt	100mg
Selenium	20.000mg

• ការប្រើប្រាស់ : ការពារបណ្តាជំងឺទះជាតិខ្លី និង បង្កើនសុខភាព ការពារ Stress និង បង្កើនការលូតលាស់ដំបូង បង្កើនគុណភាពសាច់ល្អ។

• របៀបប្រើ : លាយក្នុងមីនីមាសស្តុកសត្វ

- កូនស្រី : 1kg លាយ 400kg ចំណី
- ក្មេង : 1kg លាយ 300kg ចំណី
- ក្មេងចូល : 1kg លាយ 400kg ចំណី
- រយៈពេលប្រើប្រាស់ : ១ ឆ្នាំក្រោយពីផលិត

EXP: 02/06/2009

ផែនដី : ធីតាស៊ី លីមីត ខ្មែរស្តុកសត្វ

ផ្ទះលេខ ៣៧៧ ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ ទឹកដីស្រី ខណ្ឌព្រៃសែន រាជធានីភ្នំពេញ (កម្ពុជា)
 ទូរស័ព្ទ : 012 803 313 / 023 714 114

ស្វីតិកំណាមធាន



ការបែងចែកប្រភេទឱសថ និងការប្រើប្រាស់

ឱសថជាសារធាតុសកម្ម ហើយមានសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នា:

ដោយយោងទៅតាមប្រភេទសកម្មភាព

គេបែងចែកឱសថជា ៧ ប្រភេទ